



## ПОДГОТОВКА к эндоскопическому ИССЛЕДОВАНИЮ: **МОВИПРЕП**

Уважаемые пациенты!

От качественной подготовки зависит точность проводимого исследования. При плохой подготовке просвет кишки остается «спрятанным» под кишечным содержимым, а изучить слизистую оболочку будет просто невозможно. Такая ситуация напрямую влияет не только на качество проведения исследования, но и существенно увеличивает возникновение осложнений при проведении исследования. Очень часто при плохой подготовке к колоноскопии врач вынужден назначить повторное исследование. Поэтому отнеситесь к подготовке очень ответственно!


Дорогие пациенты! Мы хотим, чтобы даже неприятные процедуры проходили для вас максимально комфортно. Поэтому при выборе препарата для подготовки можете выбрать тот, который вам по вкусу: **кисло-сладенький МОВИПРЕП** или солененький **ЛАВАКОЛ**.

### Кисло-сладенький мовипреп

- Необходимо в течение 3 дней перед исследованием соблюдать диету
- Внимательно следовать рекомендациям по приему слабительного препарата

#### Можно есть:

- Нежирные кисломолочные продукты, сыр, сметана, сливочное масло, йогурт без добавок и наполнителей
- Яйца
- Мясо, птица и рыба нежирных сортов (в отварном, паровом или тушёном виде)
- Хорошо проваренный белый рис (кроме плова)
- Сахар, мёд (не в сотах)



Разрешённые продукты не должны содержать мелкие косточки, зёрна, семена, отруби

#### Разрешено пить:

- Бульоны (прозрачные, процеженные)
- Сок без мякоти
- Чай
- Вода
- Безалкогольные негазированные, неокрашенные напитки

При приеме последнего пакетика препарата необходимо принять препарат Симетикон (если в виде раствора - 2 столовые ложки, если в виде капсул - 2 капсулы)



Нам очень важно мнение каждого из вас!  
Пожалуйста, воспользуйтесь  
QR кодом и оставьте свой отзыв на  
портале Prodoctorov.ru  
Благодарим, что помогаете нам  
стать лучше!

**Будьте внимательны!** При проведении колоноскопии в состоянии «сна» необходимо пройти дополнительные обследования (вы можете пройти их в ТС клинике или любой другой клинике):

- ЭКГ (до 2 мес)
- Общий анализ крови (14 дней)
- УЗИ сердца (6 месяцев) - для пациентов старше 65 лет



## Если вам назначена колоноскопия в первой половине дня **ОДНОЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА**

**Рацион питания накануне дня исследования:**


**Завтрак и легкий обед до 13:00**

Согласно списку разрешённых продуктов

**Ужин**

Согласно списку разрешённых жидкостей

### **СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА МОВИПРЕП**



Содержимое одного пакетика (саше) А и одного пакетика Б развести в небольшом количестве питьевой негазированной воды до полного растворения, довести объём раствора до 1 литра. Хорошо перемешать. Желательно охладить в холодильнике. Вы должны выпить 4 пакетика препарата!

**Накануне дня** проведения исследования **с 18 часов** - начало приема МОВИПРЕП. Принимать раствор нужно по 1 стакану (200 - 250 мл) через каждые 15-20 минут. В перерывах между приемом препарата принимать любую нейтральную жидкость (вода, зеленый чай, осветленный сок).

## Если вам назначена колоноскопия во второй половине дня **ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА**

**Накануне дня** проведения исследования **с 19 часов** - начало приема МОВИПРЕП.

Принимать раствор нужно по 1 стакану (200 - 250 мл) через каждые 15-20 минут.

В перерывах между приемом препарата принимать любую нейтральную жидкость (вода, зеленый чай, осветленный сок).

**В день проведения** исследования с **6 часов утра** выпить второй литр приготовленного раствора и 1 литр нейтральной жидкости.

### **Немного информации, которая поможет вам в подготовке**

С момента начала приёма препарата МОВИПРЕП® не следует употреблять пищу,

- при этом разрешённую жидкость можно пить в неограниченном количестве. При анестезии/седации прекратить приём жидкостей не менее чем за 2 часа, но не более чем за 4 часа до начала процедуры.

- Уменьшать объём воды для приготовления раствора МОВИПРЕП® и дополнительной разрешенной жидкости нельзя.

При специфическом вкусовом восприятии препарата МОВИПРЕП® можно пить

- раствор охлаждённым, через коктейльную трубочку, рассасывать леденцовую карамель или жевательную резинку, чередовать с небольшим количеством разрешённой жидкости.

- Активное действие МОВИПРЕП® продолжается также индивидуально: в среднем в течение 2 часов.

Краснодар, Кузнечная, 4  
8 800 333 01 51  
ts@tsclinic.ru

ЛО -23-01-014017 от 22.10.2019 г.